

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Bergamo</p>	<p>ATS DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE</p> <p>STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	<p>LOGO AZIENDALE</p>
--	--	---------------------------

SCOTCH TEST


Attenzione: **per sicurezza è meglio raccogliere più di un campione, ad esempio 3 campioni da raccogliere in tre giorni successivi.**

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?


- **tre vetrini (se richiesti 3 campioni), consegnati dal Laboratorio/Centro Prelievi**
- **nastro trasparente (scotch).**

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE?

1. Fare il bidet la sera prima dell'esame, e **NON** mettere nessuna crema vicino all'ano (zona anale e perianale).
2. Il mattino, prima di andare in bagno, prendere un pezzo di scotch **TRASPARENTE**, e tenendolo ben teso alle estremità con le dita o una palettina di legno (vedi figura A), far aderire perfettamente lo scotch alla mucosa dell'ano ed alla pelle attorno, esercitando una leggera pressione (è meglio farsi aiutare da un familiare). **Non sporcare lo scotch con le feci.**



3. Staccare lo scotch con un gesto deciso e, sempre tenendolo teso, incollarlo a una faccia del vetrino, facendolo aderire bene (vedi figura B).
4. Tagliare la parte di scotch sporgente che esce dai bordi del vetrino (**NON ripiegarla indietro sull'altra faccia del vetrino!**). Avvolgere il vetrino in un pezzo di carta.



Lavare bene le mani e le forbici usate per tagliare lo scotch.

5. Portare il campione (o i tre campioni) al Laboratorio/Centro Prelievi nell'orario di accettazione.
6. I campioni dei giorni precedenti vanno conservati a temperatura ambiente.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Bergamo</p>	<p>ATS DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE</p> <p>STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	<p>LOGO AZIENDALE</p>
--	--	---------------------------

SCOTCH TEST

اختبار بالشريط اللاصق الشفاف (سكوتش)


تحذير: لأجل ضمان نجاح هذا الإختبار يجب أخذ أكثر من عينة واحدة، 3 عينات على سبيل المثال

ما هي الأدوات المستعملة لهذا النوع من الجمع؟


- ثلاث شرائح (قطع زجاجية صغيرة) (3 عينات إذا لزم الأمر)
- شريط لاصق شفاف (سكوتش)

كيف يتم جمع العينة؟

1. يجب الإستنجاء مساء يوم الإختبار مع عدم وضع أي كريمة قرب فتحة الشرج (منطقة الشرج والشرج)
2. في صباح اليوم الموالي وقبل الدخول إلى الحمام خذ قطعة من الشريط اللاصق الشفاف (سكوتش) وامسكها مشدودة في أصابعك أو في ملعقة خشبية (أنظر الشكل A) والصق الشريط جيدا في العشاء المخاطي للشرج وحول الجلد المحيط به مع ضغط خفيف (من الأفضل طلب المساعدة من أحد أفراد الأسرة)؛ لا توسخ الشريط بالبراز.



3. أزل الشريط بشكل حاسم (أنظر الشكل B) مع إبقائه مشدودا وألصقه في إحدى الشرائح (قطع الزجاج) واضغط عليه جيدا.
4. قص الزائد من الشريط الذي يخرج عن حواف الشريحة (لا يجب طيه على الجانب الآخر من الشريحة) لف الزجاج في قطعة من الورق.



5. اغسلو جيدا اليدين والمقص المستعمل في قص الشريط
6. سلموا العينة (أو العينات الثلاث) إلى المختبر \ مركز التحليلات في الوقت المحدد لها.
6. يجب أن يتم حفظ العينات السابقة في درجة حرارة الغرفة.